

medyglōbal

AestheFill®

PROTOCOLO DE
APLICACIÓN
ZONA TERCIO MEDIO Y
TERCIO INFERIOR





medyglobal

AestheFill®


PROTOCOLO DE APLICACIÓN
ZONA TERCIO MEDIO Y
TERCIO INFERIOR

¿QUÉ ES AestheFill®?

- Una nueva generación de **bioestimuladores** basados en **PDLLA** [Ácido poli-D-L-láctico].
- Lugar de origen: Corea del Sur.
- 1 vial / 200mg [154mg de PDLLA, 46mg de CMC].
- Polvo liofilizado.
- No necesita refrigeración.
- Dura entre 18 a 24 meses.
- Facilita la corrección natural de arrugas y el rejuvenecimiento de la piel a través de una estimulación eficaz del colágeno.

GRUPOS OBJETIVOS

CLIENTES QUE DESEEN...





Conseguir un aspecto natural y juvenil.
Restauración de la estructura dérmica perdida.




Mejorar la tonalidad de la piel
confiriéndole un aspecto uniforme.

ESTRUCTURA DE LAS MICROESFERAS DE PDLLA

- Material médico aprobado por la **FDA de EE.UU.** para dispositivos de relleno.
- **Technologie BPM Patentada.**
- Tamaño de las microesferas de PDLLA: 20-50 micrometros.
- **Variante Racémica.**




SUPERFICIE - Poros



La superficie de la partícula tiene múltiples poros con alta densidad. Esto sirve para atraer fibroblastos a la microesfera.


INTERIOR - Espongiforme



Caracterizado por sus estructuras internas esponjiformes. Esto permite que los fibroblastos residan y activen la formación de colágeno.

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PARTÍCULAS

PDLLA



Variante RACÉMICA

El diseño patentado aumenta en gran medida la superficie de contacto, proporcionando espacio para invitar al colágeno a residir y activarse.

PLLA






La irregularidad de la superficie de las partículas está relacionada con la formación de nódulos/ granulomas.
Difícil de distribuir uniformemente.

COMPARACIÓN DE MECANISMO

PDLLA

PLLA





PROTOCOLO DE APLICACIÓN: ZONA TERCIO MEDIO Y TERCIO INFERIOR

Cánula de 25G x 50 / 70

Dilución:

5 ml agua bidestilada + 1 ml lidocaína al 2%.

Áreas de aplicación:

2 puntos de entrada.

1 VIAL: 1,5 ml x punto.

2 VIALES: 3 ml x punto

Jow + Curva del cigomático

PACIENTES 1 VIAL

EDAD < 50 AÑOS

1 VIAL: 1,5 ml x punto.



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



1ª Aplicación

21 días después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



1ª Aplicación



21 días después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



1ª Aplicación



21 días después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



1ª Aplicación

21 días después

6 semanas después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



1ª Aplicación



21 días después



6 semanas después



Dra. Nahid Rouhipour

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



Antes



Después



21 días después



6 semanas desp



Dra. Nahid Rouhipour

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



Antes



Después



21 días después



6 semanas desp



Dra. Nahid Rouhipour

PACIENTE 1 - 1 VIAL

AestheFill®



Antes



Después



21 días después



6 semanas desp

PACIENTES 2 VIALES

EDAD > 50 AÑOS

2 VIALES: 3 ml x punto.



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



1ª Aplicación

21 días después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



1ª Aplicación

21 días después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



1ª Aplicación



21 días después



6 semanas después



Dr. Daniel Quirós

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



1ª Aplicación

21 días después

6 semanas después



Dra. Nahid Rouhipour

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



Antes



Después



21 días después



6 semanas desp



Dra. Nahid Rouhipour

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



Antes



Después



21 días después



6 semanas desp



Dra. Nahid Rouhipour

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



Antes



Después



21 días después



6 semanas desp



Dra. Ángeles Flores

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



Antes



1ª Aplicación



21 días después



Dra. Ángeles Flores

PACIENTE 2 - 2 VIALES

AestheFill®



Antes



1ª Aplicación



21 días después



Dr. Miguel Paule

AestheFill®



Antes

1ª Aplicación

21 Días después



Dr. Miguel Paule

AestheFill®



Antes



1ª Aplicación



21 Días después



Dr. Miguel Paule

AestheFill®



Antes

1ª Aplicación

21 Días después



Dr. Miguel Paule

AestheFill®



Antes

1ª Aplicación

6 semanas



Dr. Miguel Paule

AestheFill®



Antes

1ª Aplicación

6 semanas



Dr. Miguel Paule

AestheFill®





Antes

1ª Aplicación

6 semanas

DIFERENTES DILUCIONES EN BASE AL LABORATORIO REGEN BIOTECH INC.

D1.5		Aumento tisular		- Rinomodelación - Mentón
D3		Relleno tisular		- Fosa temporal - Zona frontal
D6		Mejora de la piel		
D12		Mejora de la piel II*		

*Recomendada para aquellos pacientes más jóvenes donde necesiten menos recursos para la estimulación de colágeno.

Medyglobal, después de haber realizado los protocolos con los médicos que conforman Doctors Sinergy, ha llegado a la conclusión de que la dilución más óptima es D6.


Actualmente se está evaluando dilución D8 para cuello.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN ZONA TERCIO INFERIOR: CUELLO / PAPADA

Áreas de aplicación:

4 puntos de entrada. 2 por cada lado.
2 para cuello y 2 para papada
1 VIAL: 2 ml x punto de entrada.
Distribuir de forma homogénea (retrotrazante).

Vectores cuello




Cánula 25G / 70

Dilución 1 vial: D8

7 ml agua bidestilada + 1ml lidocaína al 2%

Mismos puntos de entrada tanto para
cuello como para papada.

Vectores papada



medyglobal

www.medyglobal.com